

**KIT REGIONAL DIAGNOSTIC AVORTEMENTS OVINS :
FICHE D'ACCOMPAGNEMENT DES PRELEVEMENTS**

Elevage concerné (Nom, Prénom, Adresse)

N° de cheptel _ _ _ _ _ Vétérinaire Sanitaire

Commémoratifs :

Nombre de femelles mises à la reproduction dans le lot :

Nombre d'avortements recensés - dans les 7 derniers jours :

- dans les 3 derniers mois dans ce lot :

N° Brebis ayant avorté : Date d'avortement : __ / __ / 20__

Stade de gestation : Commentaires :

Prélèvements joints (1) :

Tube sec Tube EDTA Ecouvillon vaginal Placenta Avorton

Analyses demandées et techniques préconisées :

Maladies recherchées (techniques préconisées)	(1)	Coût total	Prise en charge	Coût final éleveur (en € H.T.)
<i>Chlamydie (PCR)</i>		112,51 € HT	CRSSA (2) 84,38 € HT	28,13 € HT
<i>Fièvre Q (PCR)</i>				
<i>Salmonellose (Bactériologie)</i>				
<i>Toxoplasmose (PCR)</i>				
Autres (Border disease, anaplasmose...) à préciser :			Plan régional maladies émergentes 50%	Selon analyse choisie

Les analyses seront effectuées par le laboratoire sous réserve que les prélèvements adéquats soient joints et en bon état de conservation.

La prise en charge par le GDS dans le cadre de la CRSSA sera effective suite à la visite du vétérinaire sanitaire dans l'exploitation si les seuils d'intervention sont atteints, si l'éleveur est cotisant à la CRSSA et à jour du paiement de ses cotisations (se référer au dos du document pour plus de détails).

Date : __ / __ / 20__

Signatures :

L'éleveur

Le vétérinaire sanitaire

Seuils d'intervention

2 situations identifiées :

- Avortements rapprochés dans le temps : à partir de 3 avortements sur 7 jours ou moins, quelle que soit la taille du cheptel ou lot d'élevage
- Avortements espacés sur une période maximale de 3 mois, par lot de reproduction et sur la période de mise-bas :
 - Moins de 250 animaux : à partir de 4 % d'avortements (soit 2 avortements dans un lot de 50 animaux + 1 avortement par tranche de 25 femelles)
 - Plus de 250 animaux : à partir du 10^{ème} avortement

Maladies faisant l'objet d'une prise en charge dans le cadre de la CRSSA

- Chlamydiose
- Fièvre Q
- Salmonellose
- Toxoplasmose

Modalités de diagnostic (technique à privilégier, matrice)

Dans le cadre du diagnostic direct, les matrices disponibles sont l'avorton, le placenta et l'écouvillon vaginal. L'idéal est de privilégier l'avorton quand ce dernier est disponible (à défaut, le placenta).

Tableau récapitulatif

Affections suspectées*	Stade de gestation préférentiel de l'avortement	Analyse à privilégier	Matrices possibles
Chlamydiose	fin de gestation	PCR	avorton, placenta ou écouvillon vaginal
Fièvre Q	fin de gestation	PCR	avorton, placenta ou écouvillon vaginal
Salmonellose	à partir du 3 ^{ème} mois	Bactériologie	avorton, placenta ou écouvillon vaginal
Toxoplasmose	quel que soit le stade	PCR	avorton (tête) ou placenta

* La recherche de la brucellose est effectuée et prise en charge dans le cadre de la police sanitaire.

Dans tous les cas, les prélèvements devront être identifiés et acheminés rapidement (idéalement moins de 24 heures), dans un emballage étanche, sous couvert du froid et avec cette fiche d'accompagnement.

Les grands principes retenus face à un épisode d'avortements répétés sont les suivants :

- Rechercher l'agent pathogène sur la brebis ayant avorté et/ou l'avorton dans la mesure où, pour l'agent concerné, il est admis ou démontré que l'excrétion est concomitante de l'avortement. **C'est l'objet de cette fiche de diagnostic direct avec une prise en charge de la CRSSA du Limousin.**
- Rechercher les anticorps chez les brebis ayant avorté depuis plus de 15 jours. L'échantillon pourra être complété par des brebis ayant présenté des troubles de la reproduction compatibles avec l'intervention de l'agent pathogène sans oublier les mères d'agneaux morts-nés. **Cela rentre dans le cadre du plan régional « maladies émergentes » avec une prise en charge de 50% des frais d'analyses.**